

Уважно ознайомтесь з усім текстом інструкції із застосування, перш ніж почати використовувати цей медичний виріб, оскільки вона містить важливу для вас інформацію. Зберігайте цю інструкцію із застосування. Можливо, вам потрібно буде прочитати її ще раз. У випадку погіршення стану, або у випадку відсутності покращення, зверніться до лікаря.



Капсули м'які Боботик® Макс 240 мг (mg) симетикону в капсулі м'якій

Медичний виріб

Зміст:

1. Що таке Капсули м'які Боботик® Макс і для чого вони застосовуються
2. Що потрібно знати, перш ніж застосовувати Капсули м'які Боботик® Макс
3. Як застосовувати Капсули м'які Боботик® Макс
4. Можливі побічні реакції
5. Як зберігати Капсули м'які Боботик® Макс
6. Інша інформація

Склад

Симетикон, желатин, гліцерин, вода очищена.

1. Що таке Капсули м'які Боботик® Макс і для чого він застосовується

Медичний виріб Капсули м'які Боботик® Макс призначений для полегшення симптомів, пов'язаних із скупченням газів у черевній порожнині, таких як метеоризм, здуття та відрижка. Крім того, Капсули м'які Боботик® Макс сприяє виведенню піни, газів і повітря з шлунково-кишкового тракту перед абдомінальними діагностичними дослідженнями — УЗД, ендоскопією та рентгенографією, що покращує якість результатів візуалізації.

2. Що потрібно знати, перш ніж застосовувати Капсули м'які Боботик® Макс

Капсули м'які Боботик® Макс не можна вживати:

- у разі підвищеної чутливості до симетикону або до будь-якого з інгредієнтів;
- у разі відомої або підозрюваної перфорації або обструкції шлунково-кишкового тракту;
- дітям до 12 років, вагітним і жінкам, під час годування груддю, якщо інше не призначено лікарем.

Попередження і запобіжні заходи:

Взаємодія симетикону у пацієнтів віком понад 12 років невідома. Через ймовірну взаємодію не рекомендується використовувати медичний виріб одночасно з іншими лікарськими засобами.

Цей медичний виріб можна використовувати людям, які страждають на цукровий діабет, оскільки він не містить цукру.

Капсули м'які Боботик® Макс не впливають на здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

3. Як застосовувати Капсули м'які Боботик® Макс

Завжди використовуйте Капсули м'які Боботик® Макс точно так, як описано в інструкції із застосування медичного виробу. Проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, якщо ви не впевнені.

Цей медичний виріб можна застосовувати протягом 4 тижнів без консультації з лікарем. За потреби, після консультації з лікарем, медичний виріб можна використовувати довше.

Дозування:

Пацієнти з розладами шлунково-кишкового тракту:

Дорослі та діти старше 12 років: 1 капсула 2 - 3 рази на день.

Приймайте Капсули м'які Боботик® Макс під час або після їжі. Цілі капсули слід ковтати, запиваючи достатньою кількістю рідини.

Перед діагностичними дослідженнями:

За день до дослідження вжити 1 капсулу ввечері (240 мг (mg) симетикону) та 1 капсулу вранці в день дослідження (240 мг (mg) симетикону).

Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену Капсул м'яких Боботик® Макс.

У разі погіршення самопочуття, повторення скарг або погіршення стану здоров'я, необхідно звернутись до лікаря для визначення причин та отримати призначення щодо відповідного лікування.

4. Можливі побічні реакції

Про значущі побічні ефекти симетикону не повідомлялося.

Повідомте виробника або Уповноваженого представника виробника в Україні у разі появи симптомів алергічних реакцій або інших побічних ефектів.

5. Як зберігати Капсули м'які Боботик® Макс

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці за температури не вище 25°C.

Не застосовуйте Капсули м'які Боботик® Макс після закінчення терміну придатності (☞), зазначеного на упаковці. Під терміном придатності слід розуміти останній день вказаного місяця.

Порожню упаковку та невикористаний медичний виріб, термін застосування якого сплинув, слід утилізувати згідно із відповідними місцевими правилами.

6. Інша інформація

Одна упаковка містить 2, 10, 20, 40 або 60 м'яких капсул та інструкцію із застосування.

Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А., вул. Пельплиньська 19, 83-200, Старогард Гданьски, Республіка Польща / Pharmaceutical Works "POLPHARMA" S.A., 19, Pelplinska Str. 83-200 Starogard Gdanski, Republic of Poland
Ел. пошта / E-mail: phv@polpharma.com
Тел. / Tel.: 22 364 61 00



UA.TR.116

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, Україна
Ел. пошта: info.ukraine@polpharma.com
Тел.: (044) 498-90-07

У разі виникнення побічних явищ з медичним виробом звертайтеся до виробника або його Уповноваженого представника в Україні.

Розшифрування символічних позначень



Виробник



Термін використання



Код партії



Офіційний знак європейської сертифікації



Ознайомитись з інструкцією із застосування



Верхня межа температури



Не використовувати у разі пошкодження пакування



Знак відповідності технічним регламентам (Україна)

Дата останнього перегляду: 02.2025